

אומדן כאב - (PAINAD) Pain Assessment in Advanced Dementia

אומדן כאב במטופלים בוגרים שאינם מתקשרים או קשיים הולכים בדמנציה.

ציוויליזציית	2	1	0	קטגורית דירוג
	נשימות כבדות ו מהירות באופן קבוע / Cheyne stokes	נשימות כבדות לסיירוגין/ נשימות מהירות לסיירוגין	רגילה	נשימה Breathing independent of vocalization
	בכי/צעקות ממשוכות/ אנהות בקול רם	נאנה לסיירוגין/ דיבור רפה	לא משמעי קולות המעידים על כאב	קולות Negative Vocalization
	כיווץ חזק של כל שרירי הפנים	עצב/מדווך מראה פנים מפוחד/קימוט מצח ו/או סביב הפה	לא הבעה/ מחיק	מימקה (בפנים) Facial expression
	נוקשה/ אגרופים קמושרים/ תגונה עוברית/ התנדבות חזקה למטפל	מתוח/ הליכה בחוסר מנוחה/ חרס מנוחה/ תנועות מונוטוניות	ניוח/ הבעה רגילה/ רווע	תנועות גוף Body language
	לא ניתן להרגעה ו/או הסחת הדעת מהכאב	נרגע על ידי מגע או קול של המטפל	אין צורך בהרגעה/ שלול/ מרוצה	הרגעת המטופל Consolability
	יחסוב ציון כולל:	כל סעיף מקבל ניקוד (בהתאם לטבלה) ולאחר מכן יש לחבר את סך הכל הנקודות		

דירוג:

- 0 לא כאב
- 1-3 כאב קל
- 4-7 כאב בינוני
- 8-10 כאב חזק